JAうご「米」生産基準　農薬リストNo，2

管理	分類	農薬名	商品番号			使用量	使用時期・期限	使用回数	使用目的	使用月日	使用月日
本田管理	殺菌剤	オリゼメート粒剤	2	0	5	3kg/10a	6月15～20日	2	いもち病		
		オリブライト粒剤	2	0	7	1kg/10a	6月20～25日	1			
		コラトップ粒剤	2	1	7	3～4kg/10a	出穂15～7日前まで	2			
		ラブサイド粉剤	2	7	1	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		ラブサイドフロアブル	2	6	8	液剤　1000倍液　100～150L	収穫―21日前まで	3			
		ビーム粉剤	2	3	9	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		ビームゾル	2	3	6	液剤　1000倍液　100～150L	収穫―21日前まで	3			
		カスラブサイド粉剤	2	1	2	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		カスラブサイドゾル	2	1	0	液剤　1000倍液　100～150L	収穫―21日前まで	3			
		ブラシン粉剤	2	5	3	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	2			
		ブラシンフロアブル	2	5	2	液剤　1000倍液　100～150L	収穫―21日前まで	2			
		モンセレン粉剤	2	6	5	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	4	もんがれ病		
		モンセレンフロアブル	2	6	4	液剤1500倍液　150L	収穫―21日前まで	4			
		モンカットファイン粉剤	2	5	8	粉剤　3～4kg/10a	収穫―14日前まで	3			
		Zボルドー	2	0	2	粉剤　3～4kg/10a	出穂20～10日前まで	1	稲こうじ病		
		ラブサイドベフラン	2	6	9			3			
	殺虫剤	オフナックバッサ粉剤	1	1	0	3～4kg/10a	出穂前まで	1	イナゴ		
		スミバッサ粉剤	1	2	8	3～4kg/10a	収穫―14日前まで	4	カメムシ他		
		スミバッサ乳剤	1	2	6	1000倍　100～150L/10a	収穫―21日前まで	4			
		トレボン粉剤	1	3	4	3～4kg/10a	収穫―7日前まで	3			
		トレボンEW	1	3	2	1000倍　150L/10a	収穫―21日前まで	3			
		トレボン乳剤	1	3	3	2000倍　150L/10a	収穫―21日前まで	3			
		バイジット粉剤	1	3	7	3～4kg/10a	収穫―21日前まで	2			
		スタークル粉剤	1	2	2	3kg/10a	収穫― 7日前まで	3			
		スタークル粒剤	1	2	3	3kg/10a	収穫― 7日前まで	1			
		スタークル液剤	1	2	4	1000倍　150L/10a	収穫― 7日前まで	3			
		キラップフロアブル	4	8	8	2000倍　150L/10a	収穫― 14日前まで	3			
	混合剤	ラブサイドトレボン	3	4	4	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3	いもち・虫ほか		
		モンラブトレボン	3	3	6	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		ラブサイドスミチオン	3	4	0	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		カスラブスミバッサ	3	0	9	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		ラブサイドスタークル	3	1	1	粉剤　3～4kg/10a	収穫―21日前まで	3			
		モンガリット粒剤	3	1	2	粉剤　3～4kg/10a	収穫―45日前まで	2			
	倒伏軽減剤	ロミカ粒剤	5	0	6	2～3kg/10a	出穂25～10日前まで	1	倒伏軽減		
		スマレクト粒剤	5	0	1	2～3kg/10a	出穂10～5日前まで	1			
		ヒビフル粉剤	5	0	5	3～4kg/10a	出穂10～5日前まで	1			
		ヒビフルフロアブル	5	0	4	100cc/10a　50～100L	出穂10～2日前まで	1			
	ラジコン防除	ビームエイトスタークルゾル	4	8	2	800ml/10a	8月中旬		いもち病・カメ虫		
		ラブサイドスタークルフロアブル	4	8	3	800ml/10a	8月下旬		いもち病・カメ虫		

注意　上記農薬リスト以外の品目については、空欄にご記入ください。（登録農薬に限ります）